

Symptômes cutanés de la theilériose bovine

par M. Jean GRIMPRET

Dans des publications antérieures, nous avons rapporté les signes bruyants qui peuvent accompagner une theilériose bovine aiguë. Une recherche et une étude plus complètes de ces cas cliniques nous ont amené à réaliser une documentation photographique qui nous a paru intéressante.


Ces accidents peuvent s'observer assez fréquemment dans les secteurs infectés de theilériose. Les bovidés de robe uniformément brune en sont les victimes presque exclusives. Nous n'avons relevé que deux cas chez des sujets de robe pie. Dans un même élevage, plusieurs animaux peuvent en présenter simultanément. Nous avons même relevé une theilériose enzootique d'étable, où tous les malades portaient des lésions de la peau.

Le processus est toujours identique : un bovidé fait une theilériose typique, avec fièvre élevée, abattement et signes ganglionnaires. L'examen du sang révèle la présence de nombreuses *Theileria*. Très vite apparaissent, sur le corps ou les membres, des zones plus ou moins vastes où la peau est tendue, dure et parcheminée. Ces zones s'agrandissent et deviennent confluentes. Enveloppé dans un sac rigide, le malade se meut difficilement et prend une attitude figée. Puis, la peau se soulève par plaques, et le bovidé fait entièrement peau neuve, par élimination de larges sphacèles.


Ces lésions sont insensibles. La chute de peau est absolument sèche; aucun exsudat n'a jamais été constaté sous les lambeaux de peau morte.

Il ne s'agit pas de phénomènes de photosensibilisation qui auraient pu être favorisés par un médicament. Les symptômes cutanés s'observent sur des malades qui n'ont subi aucun traitement et, la mise permanente à l'étable ne modifie en rien le processus de chute et de remplacement du tégument.

Des lésions cutanées ont été signalées dans la leptospirose bovine. Le diagnostic différentiel est assuré par l'absence de *Theileria*, l'allure de l'hyperthermie, les signes urinaires et la coloration des muqueuses.



Lésions de la croupe et de la cuisse.



Lésions du dos.

Enfin, le traitement classique de la theilériose aiguë, basé sur les injections de gonacrine-lomidine, associé à une médication symptomatique appropriée, a, le plus souvent, assuré la guérison, avec une longue convalescence.

Nous ignorons la cause réelle de signes cutanés aussi importants constatés au cours de theilériose aiguë. Toutefois, nous avons noté, chez tous les malades observés, des signes digestifs constants. Nous supposons qu'il pourrait exister une relation de cause à effet, entre les symptômes cutanés et les lésions du tube digestif, si fréquentes et si graves, dans la theilériose bovine aiguë.

